

Sandoz® Azithromycine

Hémiéthanolate monohydrate d'azithromycine

Comprimés de 250 mg et de 500 mg

**Antibiotique**

Le présent feuillet contient des informations importantes sur Sandoz Azithromycine. Elles ne doivent pas se substituer aux instructions de votre médecin. Lisez attentivement ces renseignements avant de prendre Sandoz Azithromycine. Conservez ce feuillet, car vous aurez peut-être besoin de le relire. Les informations sur Sandoz Azithromycine contenues dans cette notice ne sont pas exhaustives. Veuillez vous adresser à votre médecin, infirmière ou pharmacien si vous avez des questions à propos de ces informations ou si vous souhaitez en savoir plus sur Sandoz Azithromycine. Ce médicament a été prescrit exclusivement à votre intention, vous ne devez donc pas le donner à d'autres personnes. Il peut s'avérer nocif pour celles-ci, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.

QU'EST-CE QUE SANDOZ AZITHROMYCINE ?

Sandoz Azithromycine est un médicament antibiotique administré une fois par jour pour traiter les infections suivantes chez l'adulte : bronchites, certains types d'infections cutanées, affections de la gorge d'origine streptococcique (pharyngite, amygdalite) et pneumonie.

Sandoz Azithromycine permet d'enrayer le développement des bactéries qui sont à l'origine de l'infection. Il pénètre dans les tissus infectés où il est libéré progressivement. Ce médicament continue à combattre l'infection plusieurs jours après la prise de la dernière dose.

Les antibiotiques peuvent-ils guérir un rhume ou une grippe ?

Non. Les antibiotiques ne sont efficaces que pour combattre les infections d'origine bactérienne. Ils ne tuent pas les virus. Aucun antibiotique, y compris Sandoz Azithromycine, ne peut traiter les infections d'origine virale telles que le rhume ou la grippe.

Quels renseignements devez-vous fournir à votre médecin avant de commencer un traitement avec Sandoz Azithromycine ?

Seul votre médecin peut déterminer si Sandoz Azithromycine est le médicament qui vous convient. Avant de commencer le traitement avec Sandoz Azithromycine, assurez-vous d'avoir informé votre médecin si :

- vous prenez d'autres médicaments délivrés sur ordonnance, y compris la théophylline ou la warfarine;
- vous prenez d'autres médicaments sans ordonnance, notamment des remèdes naturels ou galéniques et des antiacides;
- vous êtes enceinte, pensez l'être ou allaitez;
- vous avez des antécédents de problèmes rénaux ou hépatiques;
- vous souffrez d'une quelconque affection;
- vous avez déjà souffert d'une réaction allergique à un médicament, en particulier à des antibiotiques tels que l'érythromycine;
- vous avez déjà souffert d'une réaction allergique à l'azithromycine ou à un autre ingrédient contenu dans les comprimés de Sandoz Azithromycine (cf. **QUELS SONT LES INGRÉDIENTS DES COMPRIMÉS DE SANDOZ AZITHROMYCINE ?**).

INTERACTION DE SANDOZ AZITHROMYCINE AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS

Certains médicaments peuvent compromettre l'efficacité de Sandoz Azithromycine. Consultez votre médecin avant de prendre un autre médicament délivré avec ou sans ordonnance, y compris des remèdes naturels ou galéniques et des antiacides, pendant que vous suivez un traitement avec Sandoz Azithromycine.

POSOLOGIE

- Si votre médecin vous a prescrit des comprimés de **Sandoz Azithromycine 250 mg pour un traitement de trois jours** en raison d'une bronchite :

Jours 1 à 3 : Prenez deux comprimés par jour.

Chaque comprimé contient 250 mg d'azithromycine. Les comprimés de Sandoz Azithromycine 250 mg se présentent en plaquette. Les comprimés de Sandoz Azithromycine 250 mg ne devraient pas être administrés aux enfants.

- Si votre médecin vous a prescrit des comprimés de **Sandoz Azithromycine 500 mg pour un traitement de trois jours** en raison d'une bronchite :

Jours 1 à 3 : Prenez un comprimé par jour.

Chaque comprimé contient 500 mg d'azithromycine. Les comprimés de Sandoz Azithromycine 500 mg se présentent en plaquette. Les comprimés de Sandoz Azithromycine 500 mg ne devraient pas être administrés aux enfants.

- Si votre médecin vous prescrit des comprimés de **Sandoz Azithromycine 250 mg pour un traitement de 5 jours** pour traiter des infections des voies respiratoires ou certains types d'infections cutanées :

Jour 1 : Prenez 2 comprimés en une seule prise.

Jours 2 à 5 : Prenez un comprimé par jour.

Chaque comprimé contient 250 mg d'azithromycine. Les comprimés de Sandoz Azithromycine 250 mg se présentent en plaquette. Les comprimés de Sandoz Azithromycine 250 mg ne devraient pas être administrés aux enfants.

- Si votre médecin vous prescrit des comprimés de **Sandoz Azithromycine 500 mg pour un traitement de 5 jours** pour traiter des infections des voies respiratoires ou certains types d'infections cutanées :
Jour 1 : Prenez un comprimé.
Jours 2 à 5 : Prenez 1/2 comprimé par jour.

Chaque comprimé contient 500 mg d'azithromycine.

Les comprimés de Sandoz Azithromycine 500 mg se présentent en plaquette. Les comprimés de Sandoz Azithromycine 500 mg ne devraient pas être administrés aux enfants.

Les comprimés de Sandoz Azithromycine peuvent être pris avec ou sans nourriture.

Même si vous commencez à vous sentir mieux dès les premiers jours du traitement, vous devez poursuivre le traitement avec Sandoz Azithromycine pendant toute la durée prescrite par votre médecin. Bien que le traitement avec Sandoz Azithromycine soit de courte durée, ne vous attendez pas à ce que le médicament agisse plus vite que des antibiotiques administrés pendant 10 jours. Si vous cessez votre traitement avec Sandoz Azithromycine trop tôt, l'infection risque de réapparaître sous une forme plus grave et plus difficile à traiter. Si vous ne pouvez pas prendre tous les comprimés, prévenez votre médecin.

EFFETS SECONDAIRES ÉVENTUELS

Comme tout médicament, Sandoz Azithromycine peut causer des effets secondaires légers à modérés qui disparaissent à la fin du traitement. Les plus fréquents sont :

- nausées,
- diarrhée,
- maux d'estomac,
- vomissements.

Comme pour tout antibiotique, cessez le traitement et prévenez votre médecin si votre diarrhée s'aggrave, devient plus liquide ou persiste. Cela pourrait être le symptôme d'un problème médical grave.

Des réactions allergiques à Sandoz Azithromycine sont peu fréquentes, mais peuvent être très graves si elles ne sont pas immédiatement traitées par un médecin. Si vous pensez que vous puissiez avoir une réaction allergique à Sandoz Azithromycine, cessez de prendre le médicament et appelez immédiatement votre médecin. Si vous ne parvenez pas à le joindre, rendez-vous au service des urgences de l'hôpital le plus proche. Une réaction allergique peut se traduire par des difficultés à respirer, un gonflement du visage, de la bouche et du cou, de fortes éruptions cutanées ou l'apparition de cloques.

Sandoz Azithromycine peut produire d'autres effets secondaires moins fréquents et différents de ceux qui sont énumérés ici. Si vous constatez des effets secondaires inattendus pendant votre traitement avec Sandoz Azithromycine, prévenez votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien.

QUE FAIRE EN CAS DE SURDOSAGE ?

En cas de surdosage accidentel, appelez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

QUELS SONT LES INGRÉDIENTS DES COMPRIMÉS DE SANDOZ AZITHROMYCINE ?

Les comprimés de Sandoz Azithromycine 250 mg contiennent de l'hémiéthanolate monohydrate d'azithromycine équivalant à 250 mg d'azithromycine et les excipients suivants : cellulose microcristalline, amidon de maïs, glycolate d'amidon sodique, silice colloïdale anhydrique, stéarate de magnésium, laurylsulfate de sodium, lactose monohydraté, talc, hydroxypropyl-méthylcellulose, hydroxypropylcellulose, dioxyde de titane, polyéthylène glycol et D&C Rouge n° 3 aluminum lake.

Les comprimés de Sandoz Azithromycine 500 mg contiennent de l'hémiéthanolate monohydrate d'azithromycine équivalant à 500 mg d'azithromycine et les excipients suivants : cellulose microcristalline, amidon de maïs, glycolate d'amidon sodique, silice colloïdale anhydrique, stéarate de magnésium, laurylsulfate de sodium, lactose monohydraté, hydroxypropyl-méthylcellulose, dioxyde de titane et polyéthylène glycol.

COMMENT CONSERVER SANDOZ AZITHROMYCINE ?

Gardez Sandoz Azithromycine ainsi que tout médicament hors de portée des enfants. Conservez Sandoz Azithromycine à une température ambiante contrôlée (entre 15 et 30 °C).

® Marque de commerce déposée utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.



Sandoz Canada Inc.
Qc, Canada J4B 7K8
medinfo@sandoz.com

1 800 361-3062

Révisé : novembre 2006